

## 1) Cuáles son las características que nos ayudan a diferenciar las GRAMÍNEAS DE VERANO?

**1.1) *Digitaria Sanguinalis* - pasto cuaresma.** Plántula con pelos, primera hoja ancha y tendida sobre el suelo. Lígula membranosa, pelos en lámina y vaina



**1 . 2) *Echinochloa cruz galli* - capín arroz.** Sin lígula, sin aurículas. Vaina glabra, generalmente rojiza. Lámina con nervio central marcado. Pseudotallo aplanado





**1.3) *Eleusine indica* – pata de gallina.** Lígula truncada y corta. Prefoliación conduplicada.  
Tiene 3 a 10 espigas por inflorescencia



**1.4) *Eleusine trystachia* – pata de gallina.** Lígula truncada y corta. Prefoliación conduplicada. Tiene 2 a 4 espigas por inflorescencia




**1.5) *Panicum capillare* – paja voladora.** Lígula pestañosa. Vaina y lámina con pelos.



**1.6) *Setaria sp.*** . Lígula pestañosa. Láminas glabras. Vainas pubescentes, sobre todo en el borde.



**1.7) *Urochloa platyphylla*- pasto bandera.** Lígula membranosa, ciliada, de 1 mm de longitud. Láminas con pelos en ambos lados. Vainas pubescentes y rojizas.



Gracias Carina Cabrera y Agro Slide bank por aportar algunas de estas fotos

**1.8) *Briza minor- briza*.** Lígula membranosa



**1.9) *Eragrostis*.** Lígula pestañosa. Vainas a veces rojizas, con pelos largos en los bordes. Panoja laxa.



**1.10) *lachnagrostis filiformes-* (ex *agrostis avenae*). Lígula membranosa**

