

Agronomía Inteligente #7

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 27/02/26

Resumen de la semana



sequía

AGRONOMÍA INTELIGENTE #6

Actualidad de Cultivos 20/02/2026, Sudeste de Buenos Aires

Ranking de Plagas, Enfermedades, Malezas y más


- 1 Arañuela roja**
- 2 Chinche de la alfalfa**
- 3 Carbón de la panoja**

- Grave y generalizado
- Problema en lotes puntuales
- Presencia baja, sin riesgo

NOVEDADES CAPTURAS DE ADULTOS LEPIDOPTEROS – Zona Necochea

Durante el período del 21 al 27 de febrero se registró la presencia habitual de especies de interés agronómico, entre ellas *Spodoptera frugiperda*, *Pseudaletia adultera*, *Loxostege bifidalis*, *Agrotis ípsilon*, *Faronta albilinea* y *Diatraea saccharalis*. La composición del complejo no mostró variaciones respecto de semanas previas y las capturas se mantuvieron en valores reducidos, sin indicios de incrementos poblacionales.

Registro y evolución de Adultos de Lepidópteros en Trampa de Luz en las últimas 3 semanas



¿Qué está pasando a campo?

¡Que llueva por favor!

En la zona costera y profunda se observan los cultivos de primera en buen estado, y los cultivos de segunda sembrados temprano también, los sembrados a fines de diciembre y principio de enero se observan muy atrasados y en algunos casos perdidos. En la zona más continental con ambientes someros los cultivos están muy afectados, y en buen estado en los profundos, con las mismas observaciones que la zona costera para los cultivos de segunda.

Malezas: Se observan los primeros nacimientos de raigrás en lotes con alta presión de esta maleza. En lo que respecta a nabolza y yuyo colorado todavía se observan nacimientos, pero la mayoría de lo que se ve en los lotes es por falta de control, ya en estadios reproductivos y de difícil control químico. *Eleusine indica* sigue avanzando, en general más relacionada a cabeceras. Otras malezas con poblaciones normales.

Raigrás: comenzaron los nacimientos en la zona



Benéficos: se sigue observado la presencia de insectos benéficos (arañas, crisopa, vaquitas, nabis, entre otros).

Soja: de primera entre R4V12 y R5.3V14, de segunda lotes perdidos (sobre todo los sembrados más tarde) y V4 a R3V12.

Está aumentando la presencia de Arañuela roja (*Tetranychus urticae*), presente en la mayoría de los lotes, con diferente grado de incidencia. El complejo de chinches se observa estable, con mayor presencia de la Chinche de la Alfalfa (*Piezodorus guildinii*). **Intensificar monitoreo de estas plagas.** Se siguen observando bajas poblaciones de Isoca Bolillera (*Helicoverpa gelotopon*), Medidora (*Rachiplusia nu*), Tucuras y Trips. La defoliación en general se encuentra en valores inferiores al 2%. Continúa el avance generalizado de Mancha Purpura (*Cercospora kikuchii*) y casos muy aislados con mancha Mancha Marrón (*Septoria glycines*) superando los umbrales de acción.

Girasol: de R7 a R9 con 4 a 12 hojas verdes. Se observan bajas poblaciones de Isoca Medidora (*Rachiplusia nu*), Gata peluda (*Spilosoma virginica*) y Tucuras. En lo que respecta a enfermedades, se observa una reducción de la incidencia de Alternaria y presencia puntual de Verticillium, Septoria y Mildiu. En la mayoría de los lotes se observa Roya negra (*Puccinia hlianthi*) con incidencia y severidad variable, pero en estadios avanzados del cultivo, prestar especial atención a los lotes que se encuentran en R5. El Cancro (*Phomopsis helianthi*/ *Diaporthe heliantii*) está aumentando, pero ya con estadios avanzados del girasol (R8 y R9), con incidencias del 5 al 20%, y lotes puntuales con hasta 50% de incidencia en las zonas con más desarrollo. En relación a la Mosquita del Capítulo (*Melanagromyza minimoides*) se observa bajo daño en los girasoles tempranos, daño medio en los tardíos y seguir monitoreando el girasol de segunda.

Maíz: tempranos en R4 a R5, tardíos en R3, de segunda V11 a VT, muy estresados. Se observan incidencias de Roya (*Puccinia sorghi*) del 0,1 al 4%, y carbón común (*Ustilago maydis*). En los lotes más avanzados (de R4 en adelante) se empieza a observar el Carbón de la panoja (*Sporisorium reilianum*), el cual es muy importante

cuantificar y registrar para planificar la rotación de los lotes en las próximas campañas. Se ha generalizado la presencia de la Isoca de la espiga (*Helicoverpa zea*). En lotes puntuales se observan pulgones (*Rhopalosiphum maidis*).

Soja de segunda con Arañuela roja // Girasol tardío con daño de mosquita // Maíz con *Sporisorium reilianum*.



Agronomía Inteligente #7

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 27/02/26

Informe generado por la colaboración entre



Gracias al apoyo de



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**



AGROPACK

Nutrien **AGRO**
Ag Solutions®
AgroGenerales sa

JUAN LEONCIO
IRIBERRI
NECOCHEA - ARGENTINA



El monitoreo de la evolución de estas plagas con trampa de luz no reemplaza el monitoreo a campo, sino que es una herramienta más que permite estar alerta y complementar la toma de decisiones.



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO



JUAN LEONCIO
IRIBERRI
NECOCHEA - ARGENTINA



Nutrien
Ag Solutions®