

Agronomía Inteligente #10

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 27/03/26

Resumen de la semana



AGRONOMÍA INTELIGENTE #10
Actualidad de Cultivos 20/03/2026, Sudeste de Buenos Aires

Ranking de Plagas, Enfermedades, Malezas y más

- 1 Nabolza y Yuyo Colorado**
- 2 Chinchas y Arañuela roja**
- 3 Carbón de la panoja**


- Grave y generalizado
- Problema en lotes puntuales
- Presencia baja, sin riesgo

NOVEDADES CAPTURAS DE ADULTOS LEPIDOPTEROS – Zona Necochea

Entre el 14 y el 20 de marzo se observó una presencia muy reducida de las especies de interés agronómico *Pseudaletia adultera*, *Agrotis ipsilon*, *Faronta albilinea* y nuevas capturas de *Diatraea saccharalis* y *Helicoverpa gelatopoeon*

La composición del complejo permaneció estable respecto de semanas previas y las capturas continuaron en valores bajos, sin señales de cambios en la dinámica poblacional.

Registro y evolución de Adultos de Lepidópteros en Trampa de Luz en las últimas 3 semanas



¿Qué está pasando a campo?

Y un día llovió

Esta semana llovieron entre 100 y 140 mm en la zona. Si esto es acompañado de temperaturas medias a cálidas puede ayudar a lograr un mejor rendimiento de los cultivos tardíos y de segunda de lo esperado antes de estas lluvias.

En la zona costera y profunda esperamos rendimientos en los cultivos de primera de entre un 10% y hasta un 30% por debajo de los rindes promedio, debido a la sequía durante enero y febrero. Los cultivos de segunda sembrados temprano pueden lograr rendimientos promedios, los sembrados a fines de diciembre y principio de enero se observan muy atrasados. En la zona más continental con ambientes someros los cultivos están muy afectados, esperamos un 20 a 40% menos de rinde, con las mismas observaciones que la zona costera para los cultivos de segunda.

Malezas: Se observan nacimientos de raigrás en lotes con alta presión de esta maleza. Debemos concentrarnos en sacar las nabolzas y yuyo colorado escapadas antes de la cosecha para no distribuirlas con las cosechadoras y que no semillen. En los lotes que se van cosechando de girasol, rolear para monitorear y ajustar los barbechos. Y estar muy atentos a la necesidad de limpieza de las cosechadoras para no ingresar malezas a nuestros lotes y no diseminar las malezas de nuestros lotes ya infestados. Post cosecha es muy importante intentar de que no semille el *Eleusine indica*.

Soja: de primera entre R5.5V12 y R6V14, de segunda lotes muy atrasados en R2 (los sembrados más tarde) y R5.1V12 los sembrados temprano en mejor estado.

Sigue siendo importante la presencia de Arañuela roja (*Tetranychus urticae*) en los lotes no tratados. El complejo de chinches se observa con presencia de nuevas generaciones. **No descuidar el monitoreo de estas plagas.** Se siguen observando bajas poblaciones de Isoca Bolillera (*Helicoverpa gelotopon*), Medidora (*Rachiplusia nu*), Tucuras y Trips. La defoliación en general se encuentra en valores

inferiores al 2%. Continúa el avance generalizado de Mancha Purpura (*Cercospora kikuchii*) y la presencia de bacteriosis.

Maíz: tempranos en R5 a R6, tardíos en R4 a R5, de segunda en R1, muy atrasados. La Roya (*Puccinia sorghi*) se está frenando, se observa bastante carbón común (*Ustilago maydis*). En los lotes más avanzados (de R4 en adelante) se observa Carbón de la panoja (*Sporisorium reilianum*), el cual es muy importante cuantificar y registrar para planificar la rotación de los lotes en las próximas campañas y ser cuidadoso en la cosecha.


Girasol: en R9 con 0 a 6 hojas verdes. Avanza la cosecha, siendo muy importante regular la cosechadora para cada situación y cosechar con la humedad justa para no perder rendimiento por dormirnos, ni aumento de pérdidas por retraso. En la zona de Necochea los rendimientos relevados hasta el momento están en el rango de 2000 hasta 3200 kgs/ha según calidad de lote y ambiente.

En la mayoría de los lotes se observaron altas incidencias y severidad de Roya negra (*Puccinia helianthi*), pero en estadios avanzados del cultivo. El Cancro (*Phomopsis helianthi*/ *Diaporthe heliantii*) está aumentando, pero ya con estadios avanzados del girasol (R8 y R9), con incidencias del 5 al 20%, y lotes puntuales con hasta 50% de incidencia en las zonas con más desarrollo. Comenzó a observarse Cancro del Capítulo, con incidencias de hasta el 10% y severidades del 5%.

Soja de segunda: de fecha de siembra segunda quincena de diciembre/ Maíz de segunda: en R1.



Yuyo colorado en lote de soja de segunda.



Agronomía Inteligente #10

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 20/03/26

Informe generado por la colaboración entre



Gracias al apoyo de



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**



AGROPACK

Nutrien
Ag Solutions®

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA



El monitoreo de la evolución de estas plagas con trampa de luz no reemplaza el monitoreo a campo, sino que es una herramienta más que permite estar alerta y complementar la toma de decisiones.



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA

AGROPACK



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**

Nutrien
Ag Solutions®