

Agronomía Inteligente #9

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 13/03/26

Resumen de la semana



AGRONOMÍA INTELIGENTE #9
Actualidad de Cultivos 13/03/2026, Sudeste de Buenos Aires

Ranking de Plagas, Enfermedades, Malezas y más

- 1 Arañuela roja**
- 2 Complejo de Chinchas**
- 3 Carbón de la panoja**


Legend:

- Grave y generalizado
- Problema en lotes puntuales
- Presencia baja, sin riesgo

NOVEDADES CAPTURAS DE ADULTOS LEPIDOPTEROS – Zona Necochea

Entre el 7 y el 13 de marzo se registró una presencia muy baja de especies de interés agronómico: *Pseudaletia adultera*, *Agrotis ipsilon* y *Faronta albilinea*. La composición del complejo se mantuvo sin cambios respecto de semanas anteriores y las capturas continuaron en niveles reducidos.

Registro y evolución de Adultos de Lepidópteros en Trampa de Luz en las últimas 3 semanas



¿Qué está pasando a campo?

¡Que llueva por favor!

En la zona costera y profunda los cultivos de primera están transitando un llenado de granos con malas condiciones hídricas, por lo que los rendimientos podrían terminar en un 10% a un 30% por debajo del promedio. Los cultivos de segunda sembrados temprano están tratando de generar algo de grano, aunque precisan lluvia, los sembrados a fines de diciembre y principio de enero se observan muy atrasados y es cada vez más difícil que sean rentables. En la zona más continental con ambientes someros los cultivos están muy afectados, con las mismas observaciones que la zona costera para los cultivos de segunda.

Malezas: Se observan nacimientos de raigrás en lotes con alta presión de esta maleza. Debemos concentrarnos en sacar las nabolzas y yuyo colorado escapadas para que no semillen. En los lotes que se van cosechando de girasol, rolear para monitorear y ajustar los barbechos. Y estar muy atentos a la necesidad de limpieza de las cosechadoras para no ingresar malezas a nuestros lotes y no diseminar las malezas de nuestros lotes ya infestados. Post cosecha es muy importante intentar de que no semille el *Eleusine indica*.

Benéficos: se sigue observado la presencia de insectos benéficos (arañas, crisopa, vaquitas, nabis, entre otros).

Soja: de primera entre R5.3V12 y R6V14, de segunda lotes perdidos (sobre todo los sembrados más tarde) y V5 a R5.1V12.

Sigue siendo importante la presencia de Arañuela roja (*Tetranychus urticae*), presente en la mayoría de los lotes, con diferente grado de incidencia. El complejo de chinches se observa estable. **No descuidar el monitoreo de estas plagas.** Se siguen observando bajas poblaciones de Isoca Bolillera (*Helicoverpa gelotopon*), Medidora (*Rachiplusia nu*), Tucuras y Trips. La defoliación en general se encuentra en valores inferiores al 2%. Continúa el avance generalizado de Mancha Purpura (*Cercospora kikuchii*) y la presencia de bacteriosis.

Maíz: tempranos en R5 a R6, tardíos en R4, de segunda V15 a R1, muy atrasados. Se observan incidencias de Roya (*Puccinia sorghi*) del 0,1 al 4%, y carbón común (*Ustilago maydis*). En los lotes más avanzados (de R4 en adelante) se observa Carbón de la panoja (*Sporisorium reilianum*), el cual es muy importante cuantificar y registrar para planificar la rotación de los lotes en las próximas campañas y ser cuidadoso en la cosecha. Se ha generalizado la presencia de la Isoca de la espiga (*Helicoverpa zea*). En lotes puntuales se observan pulgones (*Rhopalosiphum maidis*).

Girasol: de R8 a R9 con 0 a 6 hojas verdes. Avanza la cosecha, siendo muy importante regular la cosechadora para cada situación y cosechar con la humedad justa para no perder rendimiento por dormirnos, ni aumento de pérdidas por retraso. En la zona de Necochea los rendimientos relevados hasta el momento están en el rango de 2200 hasta 3200 kgs/ha según calidad de lote y ambiente.

Se observan bajas poblaciones de Isoca Medidora (*Rachiplusia nu*), Gata peluda (*Spilosoma virginica*) generando defoliación tardía, impacta visualmente pero en general no es relevante, y Tucuras. En lo que respecta a enfermedades, se observa la presencia puntual de Verticillium y Mildiu. En la mayoría de los lotes se observa Roya negra (*Puccinia helianthi*) con incidencia alta y severidad variable, pero avanzó en estadios avanzados del cultivo. El Cancro (*Phomopsis helianthi*/ *Diaporthe heliantii*) está aumentando, pero ya con estadios avanzados del girasol (R8 y R9), con incidencias del 5 al 20%, y lotes puntuales con hasta 50% de incidencia en las zonas con más desarrollo. Comenzó a observarse Cancro del Capítulo, con incidencias de hasta el 10% y severidades del 5%. En relación a la Mosquita del Capítulo (*Melanagromyza minimoides*) debemos estar muy atentos si tenemos algún lote de segunda muy atrasado.

Soja: zonas de calidad inferior sin producción/ Soja de segunda: en estadio de R2 a R3, muy atrasadas



Maíz: estresado, perdiendo hojas/ Maíz: diferencia de *Sporisorium reilianum* (carbón de la panoja, descubierto) y *Ustilago maydis* (carbón común, con la hiperplasia blanca que envuelve al carbón)



Agronomía Inteligente #9

(¡Que no cunda el Pánico!)

Actualidad de Cultivos del Sudeste de Buenos Aires – 13/03/26

Informe generado por la colaboración entre



Gracias al apoyo de



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**



AGROPACK

Nutrien
Ag Solutions®

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA



El monitoreo de la evolución de estas plagas con trampa de luz no reemplaza el monitoreo a campo, sino que es una herramienta más que permite estar alerta y complementar la toma de decisiones.



Terramar JV S.A.
INSUMOS AGROPECUARIOS



FOLILAGRO

AGRO
AgroGenerales sa

IRIBERRI
JUAN LEONCIO
NECOCHEA - ARGENTINA



**DORREGO, LOPEZ
& NOVES**

Nutrien
Ag Solutions®