
AGRONOMÍA INTELIGENTE

¡Que no cunda el pánico!

Actualidad de cultivos del sudeste de Buenos Aires

Informe N° 0 | Semana del 22 al 27 de noviembre de 2026 | Campaña 2026/27

1 RESUMEN DE LA SEMANA



Ranking semanal de plagas, enfermedades y malezas. Rojo: grave y generalizado · Amarillo: problema en lotes puntuales · Verde: presencia baja, sin riesgo.

ACOMPAÑAN SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR

2 TRAMPA DE LUZ · CAPTURAS DE ADULTOS DE LEPIDÓPTEROS (ZONA NECOCHEA)


Se detallan las capturas registradas en los períodos **del 13 al 20 y del 22 al 27 de noviembre** para las principales especies de interés agronómico.

> **Lectura de la semana:** predominan las capturas de **isoca desgranadora** (*Faronta albilinea*), que pasaron de 16 a 29 adultos, y de **oruga grasienta** (*Agrotis ipsilon*), con 16 y 11 adultos. El resto de las especies, con capturas bajas o sin capturas.

Nombre común	Especie	13/11 al 20/11	22/11 al 27/11
Barrenador del tallo	*Diatraea saccharalis*	**3**	**2**
Isoca medidora	*Rachiplusia nu*	**1**	**2**
Gata peluda	*Spilosoma virginica*	0	**1**
Isoca cortadora	*Agrotis malefida*	**6**	**2**
Isoca cortadora (oruga grasienta)	*Agrotis ipsilon*	**16**	**11**
Isoca cortadora	*Porosagrotis gypaetina*	**2**	0
Isoca militar verdadera	*Pseudaletia adultera*	**2**	**4**
Isoca desgranadora	*Faronta albilinea*	**16**	**29**

Se muestran solo las especies con capturas en el período. Sombreadas: 10 o más adultos en el acumulado de ambos períodos.

Capturas de adultos en trampa de luz · 13/11 al 27/11/2026



3 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO A CAMPO?

CLIMA

Luego de las abundantes precipitaciones llegaron días sin lluvias, con altas temperaturas y viento. Se puede avanzar con la siembra, pero se complica pulverizar y se acelera el ciclo de la fina.

MALEZAS

Barbechos y preemergentes complicados por el clima. Presencia generalizada de **nabolza** y **rama negra**; se observan nacimientos de yuyo colorado, lecherón, capín y cuaresma. Quedan raigrases inmortales en los lotes.

GIRASOL

Estado	De siembra a V6.
Plagas	Lotes con **importante ataque de oruga grasienta** (*Agrotis ipsilon*) y **babosas** (*Milax gagates* y *Deroceras laeve*). Bajas poblaciones de isoca medidora (*Rachiplusia nu*).
Umbral	**Orugas cortadoras. Presiembra:** 1 larva cada 3 m² (0,33/m²), que con surcos a 52 cm equivale a **≈ 1 larva cada 6 m de surco** (0,17/m lineal). **Posemergencia:** 1 larva mayor a 1,5 cm y **2 plantas cortadas cada 15 m de surco** (≈ 0,26 plantas cortadas/m² a 52 cm), o 3–5 % de plantas cortadas. *Conversión a surcos de 52 cm (1 m lineal = 0,52 m²); a 70 cm los valores por metro lineal suben un 35 %. Fuentes: Leiva, INTA Pergamino; INTA EEA Marcos Juárez (2024).*
Benéficos	Presencia de carábidos, arañas, crisopas y vaquitas, entre otros.
Enfermedades	Primeros síntomas de roya blanca.



Girasol: oruga grasienta



Girasol: daño de isoca cortadora

SOJA

Estado	**De primera:** emergiendo. **De segunda:** —
Plagas	Bicho bolita, babosas e isocas cortadoras (oruga grasienta, *Agrotis ipsilon*).
Benéficos	Presencia de carábidos y arañas.
Enfermedades	—

MAÍZ

Estado	**Tempranos:** V4 a V6. **Tardíos:** emergiendo a V2. **De segunda:** —
Plagas	En lotes puntuales, daño de babosas.
Enfermedades	—

TRIGO

Estado	**Llenado de granos:** Z71 a Z77.
Plagas	En lotes puntuales, isoca desgranadora (*Faronta albilinea*) y pulgón de la espiga (*Sitobion avenae*).
Umbral	**Isoca militar verdadera:** en grano acuoso-lechoso, 5 isocas/m² (**≈ 1 por metro lineal**); en grano pastoso blando, 15 isocas/m² (**≈ 3 por metro lineal**); en pastoso avanzado no requiere control. **Isoca desgranadora:** 5 espigas comidas/m² + 2 larvas/m² (**≈ 1 espiga comida + 0,4 larvas por metro lineal**). Larvas mayores a 1,5 cm. *Conversión a metro lineal con surcos a 20 cm (5 m lineales por m²). Fuente: Leiva, INTA Pergamino.*
Enfermedades	Mancha amarilla, septoriosis, roya anaranjada y roya amarilla.

CEBADA

Estado	**Llenado de granos:** Z75 a Z87.
Plagas	En lotes puntuales, isoca desgranadora (*Faronta albilinea*).
Umbral	Se usan como referencia los mismos umbrales que en trigo para isoca militar verdadera y desgranadora.
Enfermedades	Ramularia, mancha en red, escaldadura y roya.

El monitoreo de estas plagas con trampa de luz no reemplaza el monitoreo a campo:
es una herramienta más que permite estar alerta y complementar la toma de decisiones.
Los umbrales son orientativos.

¿Consultas? Esteban Bilbao · Agroestudio Viento Sur · Tel./WhatsApp **2262-620544**

ACOMPAÑAN SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR SPONSOR